

Timebestilling koronavaksine ?

i Du må [logge inn](#) for å fylle ut og sende dette skjemaet.

Svarene dine blir ikke sendt inn til vaksinasjonsstedet, de skal kun legge til rette for trygg vaksinasjon av deg.

Har du **mastcellesykdom**?

- Ja
 Nei

Logg inn for å sende inn

Har du **astma**?

- Ja
 Nei

Har du på grunn av astma i løpet av det siste året fått minst 2 kortisonkurer eller vært innlagt i sykehus?

- Ja
 Nei

Har du på grunn av astma hatt minst tre av følgende symptomer siste fire uker:

- Symptomer på dagtid mer enn to ganger per uke
- Våknet på natten

- Behov for anfallsmedisin mer enn to ganger per uke
- Begrensning i fysisk aktivitet

Ja

Nei

Har du hatt **allergisk reaksjon** på denne vaksinen eller innholdstoffene tidligere?

Ja

Nei

Har du tidligere hatt alvorlig (livstruende) **allergisk reaksjon** på andre vaksiner, mat, medisiner eller annet?

Ja

Nei

Har du **økt blødningstendens**?



Ja

Nei

Har du **kraftig redusert immunforsvar**?

Ja

Nei

Har du **gjennomgått koronasykdom** for mindre enn 3 måneder siden?

Ja

Nei

Ammer du eller er du gravid?

- Ja
 Nei

Kontakt lege for vurdering

For å kunne gjennomføre en trygg vaksinerings bør du søke råd hos lege. Dersom du har fått individuell vurdering av lege på om du skal vaksineres, kan du gå videre i bestillingen.

Dette bør du informere om når du møter til vaksinasjon:

Du har økt blødningstendens

Hvis du har økt blødningstendens grunnet bakenforliggende sykdom bør du kontakte lege for individuell vurdering. Hvis du har blødersykdom og behandles med koagulasjonsfaktor, bør du vaksineres samme dag som du har fått siste dosering med koagulasjonsfaktor.

Du har tidligere hatt en allergisk reaksjon

Før vaksinasjonen bør du vurdere vaksinasjonen med lege. Dersom lege anbefaler vaksine kan det være behov for økt beredskap for å håndtere eventuelle allergiske reaksjoner, samt forlenget observasjonstid etter vaksinasjon

Redusert immunforsvar

Dersom du har alvorlig immunsvikt eller bruker medisiner som gir kraftig reduksjon av immunforsvaret grunnet for eksempel hematologisk kreft, benmargstransplantasjon eller organtransplantasjon anbefales det kortere intervall mellom dosene for enkelte vaksiner.

Gjør vaksinasjonsstedet oppmerksom på at du tilhører denne gruppen, så de tilrettelegger vaksinasjonsplanen din. Hvis du er i tvil om du tilhører gruppen bør du kontakte din behandlende lege for råd.

Du har astma

Sammen med lege kan dere legge en plan for hvordan man skal gjennomføre trygg vaksinerings.

Gjennomgått koronasykdom

Om du skal vaksineres, bør det gå minst 3 måneder etter at du ble frisk.